

6. Wat te verwachten van de behandeling?

Enkele uren tot een paar dagen na het infuus merkt u afname van de pijn. Bij de meeste patiënten werkt dit vier tot zes weken na. Indien u goed geholpen bent met deze infuustherapie, krijgt u meerdere afspraken voor volgende behandelingen vooruit gepland. U wordt ook regelmatig op de consultatie gezien ter controle.

Bij sommige patiënten heeft het medicijn helaas geen of te weinig effect of treden er bijwerkingen op. Verderzetting van de infuustherapie heeft dan geen zin.

7. Mogelijke neveneffecten

De behandeling is over het algemeen veilig. Aan elke toediening van elk medicijn zijn echter mogelijke nevenwerkingen verbonden.

Lidocaïne kan de volgende bijwerkingen geven: Hoofdpijn, bloeddrukschommelingen, veranderingen in hartritme en slaperigheid.

De meeste bijwerkingen zijn van korte duur en treden voornamelijk op tijdens de behandeling. Het gevoel van slaperigheid kan nog even aanhouden.



**Linisol
infuustherapie**



Indien u nog vragen heeft over de behandeling, aarzel dan niet om te bellen naar het secretariaat van het pijncentrum.

Wij zijn bereikbaar op het nummer 09 224 50 19

Ma	Di	Woe	Do	Vrij
08:30	08:30	08:30	08:30	08:30
–	–	–	–	–
12:00	12:00	12:00	12:00	12:00
13:00		13:00	13:00	13:00
–		–	–	–
16:00		16:00	16:00	16:00

Pijncentrum Gent
Dr. G. Brusselmans – Dr. D. Logé
AZ Sint-Lucas
Campus Sint-Lucas, straat 79
Blok W verdieping 1
Groenebriel 1 – 9000 GENT

1. Wat is een Lidocaïne infuus?

Lidocaïne is een lokaal verdovend middel dat aan pijnverlichting kan doen. De stof zwakt de abnormale pijn prikkelgeleiding naar de hersenen af, zonder het normaal functioneren van het zenuwstelsel in het gedrang te brengen. Bij rechtstreekse toediening van Lidocaïne in het bloed heeft het vooral een rechtstreeks effect ter hoogte van de hersenen.

Het wordt onder andere gebruikt tegen pijn door CRPS (Complex Regionaal Pijn Syndroom), FBSS (Failed Back Surgery Syndrome), fibromyalgie en andere neuropathische pijnsyndromen. Lidocaïne infuustherapie wordt pas opgestart nadat meerdere andere medicijnen en/of interventies geprobeerd zijn en de patiënt multidisciplinair geëvalueerd is.

Het middel wordt intraveneus toegediend via een infuus in een ader. Het kan ook subcutaan (onderhuids) toegediend worden via een subcutaan naaldje.



2. Voorbereiding

- ✓ De toediening van Lidocaïne gebeurt via een infuus in de ader tijdens een dagopname.
- ✓ U dient hiervoor niet nuchter te zijn.
- ✓ Thuismedicatie en pijnstillers mogen ingenomen worden zoals gewoonlijk. Ook bloedverdunners neemt u door zoals gewoonlijk.
- ✓ U hoeft geen nachtkledij of toiletgerief mee te brengen.
- ✓ U mag de dag van de behandeling niet actief deelnemen aan het verkeer. Zorg ervoor dat iemand u naar huis kan brengen na de behandeling.
- ✓ Tijdens de behandeling mag er geen bezoek bij u blijven. Uw begeleider kan intussen in de lounge of de cafetaria verblijven (gelijkvloers).
- ✓ Indien u op de dag van de behandeling koorts heeft of ziek bent, neem dan contact op met het secretariaat van het pijncentrum op het nummer 09 224 50 19.
- ✓ Indien u zwanger bent of een vermoeden daarvan heeft kan de behandeling niet doorgaan.
- ✓ Meldt allergieën aan medicatie, verdovingsstof of pleisters aan de arts of verpleegkundige.
- ✓ Uw kledij en persoonlijke spullen worden opgeborgen in een koffer aan het voeteneinde van uw bed. Breng zo weinig mogelijk spullen mee en vermijd grote handtassen zodat alles in de koffer past.
- ✓ Indien echt nodig kan u ook gebruik maken van een locker. Hiervoor heeft u een muntstuk van 1 euro of 2 euro nodig.

3. Inschrijving en opname

In de inkom van campus Sint-Lucas (straat 60, vlak naast het onthaal) schrijft u zich met uw identiteitskaart in voor een **dagopname pijncentrum**. Volg de wegwijzers aan het plafond naar straat 79 (Blok W, eerste verdieping). Scan uw

QR-code ter hoogte van wachtzaal A en neem plaats in wachtzaal A.

Een verpleegkundige van het dagziekenhuis komt u halen uit de wachtzaal. In een afgescheiden opnamelokaal worden samen met u alle medisch relevante zaken overlopen.

Vervolgens krijgt u een bed met koffer toegewezen in de opnamezaal. Omwille van praktische redenen kan hier geen bezoek bij u blijven.

U trekt een operatiehemd aan, dit sluit aan de achterkant. Uw bh en broek mag u aanhouden.

4. De behandeling

De verpleegkundige plaatst het infuus in een ader. Er wordt langs dit infuus continue infusievloeistof toegediend. De spuit met het medicijn wordt via een aparte leiding met een beveiligde terugslagklep op het infuus aangesloten. De spuit wordt gecontroleerd leeg geduwd door een medicijnpomp. De dosering van het medicijn wordt op basis van uw gewicht bepaald door de arts en indien nodig aangepast.

Gedurende de volledige behandeling wordt u continue gemonitord. De elektrische activiteit van uw hart, uw polsslag, het zuurstofgehalte in uw bloed en uw bloeddruk worden goed in de gaten gehouden.

Het infuus loopt gedurende 2 uren.

5. Na de behandeling

Na 2 uur wordt de toediening stopgezet. U dient nog een half uur in het ziekenhuis te blijven.

Op de dag van uw behandeling mag u niet actief deelnemen aan het verkeer. Zorg op voorhand zelf voor een begeleider of bezoldigd vervoer of neem het openbaar vervoer.

Er wordt voor deze behandeling één dag arbeidsongeschiktheid voorzien, met name de dag van de behandeling zelf.